

STI - Sexuell übertragbare Infektionen



MEDICA
Medizinische Laboratorien

Liebe Patientin, lieber Patient

Die Durchführung einer Testung auf sexuell übertragbare Krankheiten (STI-Testung) kann verschiedenste Gründe haben:

- Es lag eine Risikosituation vor
- Sie beginnen eine neue Partnerschaft
- Sie vermuten/wissen von der Untreue Ihres Partners/Ihrer Partnerin
- etc.

Die häufigsten Verursacher von STIs sind sowohl bakterielle Erreger (Chlamydien, Gonokokken, Treponemen, etc.) als auch virale Erreger (HIV, Hepatitis B und C Virus, etc.). Einige dieser Erkrankungen weisen schnell Symptome auf wie zum Beispiel Syphilis (Lues, *Treponema pallidum*) und Gonorrhoe («Tripper», *Neisseria gonorrhoeae*), andere wie zum Beispiel Chlamydien bleiben häufig symptomlos und damit lange unerkant und werden erst im Rahmen anderer Abklärungen nachgewiesen.

Bei Symptomen an den äusseren Geschlechtsorganen wie Brennen, Jucken, ungewöhnlicher Ausfluss, Veränderungen der Haut und Schleimhäute oder Geschwüren sollte unverzüglich eine Testung durchgeführt werden. Früh erkannt lassen sich diese Krankheiten in der Regel gut und erfolgreich behandeln.

Wird eine STI nachgewiesen, so ist es wichtig, dass auch die Sexualpartner informiert und getestet bzw. mitbehandelt werden, um einen sogenannten «Ping-Pong-Effekt» der gegenseitigen Reinfektion zu verhindern.

Die häufigsten Erreger von STIs in der Schweiz sind:

Hepatitis B (Hepatitis B Virus) | Sehr hohes Ansteckungsrisiko

Über eine Leberentzündung Entwicklung bis hin zu Leberzirrhose und Leberkrebs möglich.
Impfung verfügbar | **Suchtest aus Blut**

- Anti-HBs/Impftiter 18.00 CHF (HBSI/HBSIQ)
- Anti-HBc 18.00 CHF (HBCI)
- HBs-Antigen 15.70 CHF (HBSAG)

Hepatitis C (Hepatitis C Virus)

Über eine Leberentzündung Entwicklung bis hin zu Leberzirrhose und Leberkrebs möglich.
Suchtest aus Blut

- Anti-HCV 22.50 CHF (HCAK)

HIV (Human Immunodeficiency Virus)

Erreger von AIDS | **Suchtest aus Blut**

- HIV1/2-AK p24-Ag Combo 18.00 CHF (HIVC)

Syphilis (= Lues, Treponema pallidum) | Sehr hohes Ansteckungsrisiko

Beginn i. d. R. mit schmerzlosem Geschwür, in spätem Stadium auch Befall des Nervensystems möglich. | **Suchtest aus Blut**

- Lues-Screen 37.80 CHF (TP11)

Chlamydia trachomatis

Kann unbehandelt zu Unfruchtbarkeit führen, häufig symptomlos

PCR-Test aus Urin (2 Stunden vorher nicht auf die Toilette gehen)

- Chlamydia trachomatis PCR 47.70 CHF (CTRDQ)

Gonorrhoe (Neisseria gonorrhoeae)

PCR-Test aus Urin (2 Stunden vorher nicht auf die Toilette gehen)

- Neisseria gonorrhoeae PCR 47.70 CHF (NGODQ)

Kombinationstestung von Chlamydia trachomatis und Neisseria gonorrhoeae

aus Urin mittels PCR

- C. trachomatis und N. gonorrhoeae PCR 71.10 CHF (CTNGD)

Pro Auftrag wird eine Bearbeitungstaxe von 21.60 CHF plus Blutentnahme 5.90 CHF belastet.



Drop-In ohne Voranmeldung

Öffnungszeiten Drop-In

Montag bis Freitag: 7.30–18.00 Uhr

Samstag: 7.30–11.30 Uhr

MEDICA

Medizinische Laboratorien AG

Wolfbachstrasse 17
8032 Zürich



MEDICA

Medizinische Laboratorien

MEDICA

Medizinische Laboratorien AG

Wolfbachstrasse 17 | Postfach
8024 Zürich

www.medica.ch

© 2024 MEDICA Medizinische Laboratorien AG. Alle Rechte vorbehalten. Für Versehen, Fehler oder ungenaue Preisangaben wird im gesetzlich zulässigen Umfang jegliche Haftung abgelehnt. Die Texte, Bilder und Inhalte unterliegen dem Copyright von MEDICA Medizinische Laboratorien AG.

Ausgabe 08/2024