



Wolfbachstrasse 17
**Ambulatorium
nur für Blutentnahmen**



medica

MEDIZINISCHE LABORORIEN Dr. F. KAEPPELI AG
Wolfbachstrasse 17, Postfach, 8024 Zürich
Telefon 044 269 99 99, Fax 044 269 99 09
info@medica.ch www.medica.ch

Öffnungszeiten Labor

Montag bis Freitag: 7.30 – 18.00 Uhr | Samstag: 7.30 – 11.30 Uhr

www.medica.ch

medica

MEDIZINISCHE LABORORIEN Dr. F. KAEPPELI AG

STI

Sexuell übertragbare Infektionen



www.medica.ch

Liebe Patientin, lieber Patient

Die Durchführung einer Testung auf sexuell übertragbare Krankheiten (STI-Testung) kann verschiedenste Gründe haben:

- Es lag eine Risikosituation vor
- Sie beginnen eine neue Partnerschaft
- Sie vermuten/wissen von der Untreue Ihres Partners/Ihrer Partnerin
- etc.

Die häufigsten Verursacher von STIs sind sowohl bakterielle Erreger (Chlamydien, Gonokokken, Treponemen, etc.) als auch virale Erreger (HIV, Hepatitis B und C Virus, etc.).

Einige dieser Erkrankungen weisen schnell Symptome auf wie zum Beispiel Syphilis (*Lues, Treponema pallidum*) und Gonorrhoe («Tripper», *Neisseria gonorrhoeae*), andere wie zum Beispiel Chlamydien bleiben häufig symptomlos und damit lange unerkant und werden erst im Rahmen anderer Abklärungen nachgewiesen.

Bei Symptomen an den äusseren Geschlechtsorganen wie Brennen, Jucken, ungewöhnlicher Ausfluss, Veränderungen der Haut und Schleimhäute oder Geschwüren sollte unverzüglich eine Testung durchgeführt werden. Früh erkannt lassen sich diese Krankheiten in der Regel gut und erfolgreich behandeln.

Wird eine STI nachgewiesen, so ist es wichtig, dass auch die Sexualpartner informiert und getestet bzw. mitbehandelt werden, um einen sogenannten «Ping-Pong-Effekt» der gegenseitigen Reinfektion zu verhindern.

Die häufigsten Erreger von STIs in der Schweiz sind:

Hepatitis B (Hepatitis B Virus) | Sehr hohes Ansteckungsrisiko

Über eine Leberentzündung Entwicklung bis hin zu Leberzirrhose und Leberkrebs möglich. Impfung verfügbar | **Suchtest aus Blut**

• Anti-HBs/Impftiter	18.00 CHF (HBSI/HBSIQ)
• Anti-HBc	18.00 CHF (HBCI)
• HBs-Antigen	15.70 CHF (HBSAG)
• HBV Hepatitis-B-Virus, DNA, quantitativ (EDTA)	119.70 CHF (HBDAT)

Hepatitis C (Hepatitis C Virus)

Über eine Leberentzündung Entwicklung bis hin zu Leberzirrhose und Leberkrebs möglich.

Suchtest aus Blut

• Anti-HCV	22.50 CHF (HCAK)
• HCV-Combo	142.20 CHF (HCVC=HCAK+HCAG)
• Hepatitis-C-Virus, RNA, quantitativ (EDTA)	119.70 CHF (HCRAT)

HIV (Human Immunodeficiency Virus)

Erreger von AIDS | **Suchtest aus Blut**

• HIV1/2-AK p24-Ag Combo	18.00 CHF (HIVC)
• HIV-1, RNA, quantitativ (EDTA)	119.70 CHF (HIRAT)

Syphilis (=Lues, *Treponema pallidum*) | Sehr hohes Ansteckungsrisiko

Beginn i.d.R. mit schmerzlosem Geschwür, in spätem Stadium auch Befall des Nervensystems möglich. | **Suchtest aus Blut**

• Lues-Screen	37.80 CHF (TP1I)
• <i>Treponema pallidum</i> PCR (Genitalbstrich)	119.70 CHF (TREPQ/HUUCDQ)

Chlamydia trachomatis

Kann unbehandelt zu Unfruchtbarkeit führen, häufig symptomlos

PCR-Test aus Urin (2 Stunden vorher nicht auf die Toilette gehen)

• <i>Chlamydia trachomatis</i> PCR	47.70 CHF (CTRQDQ)
------------------------------------	--------------------

Gonorrhoe (*Neisseria gonorrhoeae*)

PCR-Test aus Urin (2 Stunden vorher nicht auf die Toilette gehen)

• <i>Neisseria gonorrhoeae</i> PCR	47.70 CHF (NGODQ)
------------------------------------	-------------------

Kombinationstestung von *Chlamydia trachomatis* und *Neisseria gonorrhoeae* aus Urin mittels PCR

• <i>C. trachomatis</i> und <i>N. gonorrhoeae</i> PCR	71.10 CHF (CTNGD)
---	-------------------

Pro Auftrag wird eine Bearbeitungstaxe von 21.60 CHF plus Blutentnahme 5.90 CHF belastet.